

Blutoxol

Flydende desinfektionsrengøringsmiddel koncentrat til levnedsmiddelområdet

- ▲ Hurtigt virkende køkkendesinfektionsrengøringsmiddel
- ▲ EN-kontrolleret og IHO-listet rengørings- og desinfektionsmiddel til overfladesinfektion
- ▲ Effektiv mod salmonella, listeria og norovirus
- ▲ Effektiv mod SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▲ Fjerner fedt, olie og protein
- ▲ Uden duftstoffer
- ▲ Alkalisk
- ▲ En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevarerområdet



Anvendelsesområder

Til rengøring og desinficering af vand- og alkalibestandige gulv-, væg-, og arbejdsoverflader samt køkken- og arbejdsredskaber i fødevarerforarbejdende virksomheder. Ikke på alkalifølsomme overflader eller overflader, der er plejet med 1-komponents-polish.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. 1 dosering = 25 ml.

Fremstilling af brugsopløsning:

Opløsningen skal altid blandes med koldt vand! Dosering se tabel. Fyld 500 ml skumdyseflasken til markering med koldt vand og tilføj 1 dosering fra 1-L-koncentratflasken eller via et Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiExpress). 500-ml-skumdyseflasken fyldes via et egnet Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiStation, DosiJet). Anvend 2-L- og 5-L-beholderen via et egnet Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Desinficerende rengøring:

Væd hele arealet med desinfektionsløsningen (ca. 15–20 ml/m²), og bearbejd med rengøringstekstil eller rengøringsapparat. Forbrug: 0,1 ml/m².

Overflader og køkkenredskaber, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal efter indvirkningstiden skylles grundigt med ferskvand. Ved fedt- eller proteinaflejringer skal produktet påføres i den tilsvarende anvendelseskoncentration (koldt), og efter påvirkningstiden ved skrubning kommes varmt vand på gulvet via maskinens lufttank.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Biocidprodukter skal anvendes forsigtigt. Skiltet og produktinformationerne skal altid læses inden brug.
DK: Levnedsmiddelstyrelsen Jr. No 2015-29-7105-00078

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, organisk salt, uorganisk salt, biocider, farve.

pH-værdi (koncentrat): ca. 13

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 11

Virkemidler pr. 100 g:

2,4 g Didecyltrimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 1,9 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid (CAS: 68391-01-5).

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j550302	6 x 1 L doseringsflasker (karton)	84
j550308	3 x 2 L flasker (karton)	130
j550305	2 x 5 L dunke (karton)	56

Blutoxol

Flydende desinfektionsrengøringsmiddel koncentrat til levnedsmiddelområdet

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, GHS09, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Potassium Silicate / Benzalkonium Chloride (INCI)

Test og godkendelser

Doseringsanbefaling for overfladedesinfektion i industriel, institutionel og fødevarerområdet

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid	Testbakterier
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	baktericid / levurocid	høj	5 %	500 ml/10 L	60 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Candida albicans, Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitativ overfladeforsøg	begrænset virucid					

Yderligere tests

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid	Testbakterier
industriel, institutionel og fødevareområdet						
EN 1276 Kvantitativ suspensionsforsøg	baktericid	lav	2 %	200 ml/10 L	5 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Kvantitativ suspensionsforsøg	levurocid	lav	0,5 % 1 %	50 ml/10 L 100 ml/10 L	15 min 5 min	Candida albicans
		høj	2 % 3 %	200 ml/10 L 300 ml/10 L	15 min 5 min	
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	baktericid	lav	7,5 %	750 ml/10 L	5 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium
		høj	5 %	500 ml/10 L	30 min	
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	levurocid	lav	3 % 2 %	300 ml/10 L 200 ml/10 L	15 min 30 min	Candida albicans
		høj	4 % 3 %	400 ml/10 L 300 ml/10 L	15 min 30 min	
virucidi						
EN 14476 Kvantitativ suspensionsforsøg	begrænset virucid	høj	7,5 %	750 ml/10 L	60 min	Modificeret vacciniavirus ankara (MVA)
	norovirus	lav	7,5 % 5 %	750 ml/10 L 500 ml/10 L	30 min 60 min	Murines Norovirus (MNV)
		høj	7,5 %	750 ml/10 L	30 min	
EN 16777 Kvantitativ overfladeforsøg	begrænset virucid	høj	7,5 % 5 %	750 ml/10 L 500 ml/10 L	30 min 60 min	Modificeret vacciniavirus ankara (MVA)

* iht RKI-anbefaling Bundesgesundheitsblatt 01/-2004, se også www.desinfektionsmittelliste.de