

Acidodes

Flydende desinfektion på syrebasis

- ▲ Højaktivt desinfektionsrengøringsmiddel på syrebasis med Korrosionsbeskyttelse
- ▲ Desinficerende virkning bekræftet med EN-normer
- ▲ Velegnet til brug i sundhedsvæsenet, levnedsmiddelområdet og i svømmehaller
- ▲ Fremragende rengørings effekt ved lav koncentration
- ▲ Fjerner kalkbelægninger, urinsten og belægninger med fedt, olie og æggehvidthoffer
- ▲ Uden duft- og farvestoffer
- ▲ Indeholder ikke salt- og fosforsyre
- ▲ Godkendelse til brug i levnedsmiddelområdet foreligger
- ▲ Kan også anvendes i skumanlæg
- ▲ Virker mod vorter
- ▲ Virker mod SARS-CoV-2



Anvendelsesområder

Kan anvendes på syre- og vandbestandige overflader og genstande i sanitets-, svømmehal-, køkken- og levnedsmiddelområder. Syrefølsomme overflader såsom beskadiget krom på armaturer, messing, Eloxal, polyamid og syrefølsomme natur- og kunststen kan ved brug af syre tage skade.

Anvendelse

Før anvendelse, foretag kemibeständig test på et ikke synligt sted. Generelt skal fuger og armaturer gøres våde før afsyring. Beskyt genstande og overflader der grænser op til det afsyrede.

Fabrikation af brugsopløsning:

Midlet tilsættes altid i koldt vand! Dosering: se tabellen.

Desinficerende rengøring:

Overfladen vådgøres helt med desinfektionsopløsningen (ca. 15–20 ml/m²) og bearbejdes med rengøringstextilet eller rengøringsredskabet.

Maskinel vådrengøring:

200–400 ml til 10 L koldt vand.

Skumrengøring:

Produktet fortyndes 1:1 med koldt vand og fyldes i beholder, og der vælges dyse med 10 % blanding. Overfladen skummes ind, lad virke i 10 min. skyld herefter af med rent vand.

Overflader og køkkenmaskiner der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal, efter virketiden skylles efter flere gange med vand.



Bemærk

Kemil og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Produkter indeholdende Biocid anvendes med forsigtighed. Før brug, læs mærkning og produktinformation.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer <5 %, organisk syre, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionbeskytter, biocider
pH-værdi (Koncentrat): < 0,5
pH-værdi (Brugsopløsning): ca. 2

Virkemidler pr. 100 g:

7 g didecyldimethylammoniumchlorid

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, GHS07, GHS09, Fare. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. P271 Undgå udløbning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjnebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder Methanesulphonic Acid / Didecylidimonium Chloride (INCI)

Acidodes

Flydende desinfektion på syrebasis

Test og listning

Doseringsanbefalinger til overfladedesinfektion i sundhedsvæsenet

Testkriterier	Virkeområde	Belastning	Dosering		Virketid	Virkning testet mod centrale mikroorganismer
EN 16615 / 4-felttest VAH-certificeret anvendelsesbefaling til overfladedesinfektion med mekanik	baktericid / levurocid	høj	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modi- ficeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitativ overfladetest	begrænset viruzid (ind- kapslede vira)					

Doseringsanbefalinger til overfladedesinfektion i levnedsmiddeldområder

Testkriterier	Virkeområde	Belastning	Dosering		Virketid	Virkning testet mod centrale mikroorganismer
EN 16615 / 4-felttest	baktericid / levurocid	høj	2 %	200 ml/10 L	5 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modi- ficeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitativ overfladetest	begrænset viruzid (ind- kapslede vira)					

Yderligere tests

Testkriterier	Virkeområde	Belastning	Dosering		Virketid	Virkning testet mod centrale mikroorganismer
Medicinsk område						
EN 13727 Kvantitativ suspension test	baktericid	høj	2 % 1 % 0,5 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L 50 ml/10 L	1 min 5 min 15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Kvantitativ suspension test	levurocid	høj	0,5 % 0,1 %	50 ml/10 L 10 ml/10 L	1 min 5 min	Candida albicans
Virucid						
EN 14476 Kvantitativ suspension test	begrænset viruzid (ind-kapslede vira)	høj	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 5 min	Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitativ overfladetest	begrænset viruzid (ind-kapslede vira)	høj	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 15 min	Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 14476 Kvantitativ suspension test	Vorter vira	høj	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 5 min	Polyomavirus
EN 16777 Kvantitativ overfladetest	Vorter vira	høj	2 %	200 ml/10 L	5 min	Polyomavirus

Se også www.desinfektionsmittelliste.de